

# PROFESSOR

*Soja précoce*  
*Milieu à fin de groupe 00*

*L'essentiel*

*Très haut niveau  
en protéines  
et potentiel*

*Très haute teneur en  
protéines*

*Bonne vigueur  
à la levée*



**caussadesemencespro**

# PROFESSOR

Soja précoce milieu à fin de groupe 00



## Profil variétal

Inscription : CTPS France 2019
Groupe 00 : Milieu à fin de groupe
Débouché : Alimentation animale et humaine
Croissance : Semi déterminée
Couleur de gousse : Brune
Couleur du hile : Brun marbré
Terminaison foliaire : Arrondie ovale
Couleur floraison : Violette
Teneur en protéines : Très élevée
Rendement protéines : Élevé à très élevé
Teneur en huile : Moyenne

## Profil agronomique

	B/TB	Vigueur au départ
	Courte	Hauteur plante
	Basse	Hauteur 1ère gousse
	PS	Sensibilité verse
	PS	Sensibilité Sclerotinia
	Très élevé	PMG
<b>Sélectivité Herbicides</b>		
	PS	Sélectivité Pendiméthaline
	AS	Sélectivité Métobromuron
	PS	Sélectivité Métribuzine

AS : Assez Sensible – S : Sensible – MS : Moyennement Sensible  
PS : Peu Sensible - TPS : Très Peu Sensible

Sources : CTPS/GEVES/ARVALIS Institut du végétal/R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

## L'essentiel

Très haut niveau en protéines et potentiel.

Bonne vigueur à la levée.

Très haute teneur en protéines.

Peut convenir pour des débouchés alimentation humaine.

Résultats essais France

Variété	Rendement pluriannuel (q)				Teneur en protéines (%)	Rendement protéines (%)	PMG	Hauteur plante (cm)	Hauteur 1ère gousse (cm)
	2018	2019	2020	Moyenne					
PROFESSOR	45,1	40,2	39,7	41,7	42,8	17,8	220,8	84,1	11,2
%/moyenne	102,0	100,9	107,0	103,2		108,5			
Points/moyenne					+2,1		+18,7	-0,4	-0,7
Moyenne	44,2	39,8	37,1	40,4	40,7	16,4	202,1	84,5	11,9
Nombre de références	11	18	15	44	29	29	22	18	18


Source : Base de données CAUSSADE SEMENCES PRO

## Préconisations

• **Conseils de semis** : privilégier un semoir monograinne à 2 ou 3 cm de profondeur semer dans un sol réchauffé (>10°C), ressuyé. S'assurer que les températures soient supérieures à 10°C les jours suivant le semis. Penser à adapter les préconisations pour des semis tardifs, en dérobé ou en culture biologique.

• **Écartement entre rangs** : privilégier un écartement de 18 à 50 cm.

### • Zone de culture



■ culture principale  
■ culture dérobée ou semis tardifs  
Source : Terres Inovia

### • Densité de semis

Conduite	Obj. peuplement (pieds / ha)	Densité semis (graines / ha)
Sec ou conditions stressantes	550 000	610-690 000
Irrigué ou bonnes conditions	450 000	500-600 000