WWW.SUEDWESTSAAT.DE

MONOMAX

BIO

- Engrain
- Gain de rendement significatif
- Glumes noires
- Excellente tenue de tige
- Aptitude à la panification nettement améliorée



Une nouvelle ère s’ouvre pour l’engrain !

SÜD-WEST SAAT

MONOMAX

MONOMAX présente une meilleure compétitivité au stade juvénile que les autres variétés d'engrain. 12 000 ans après sa première mise en culture, l'engrain connaît une renaissance avec MONOMAX !



BIO

Caractéristiques variétales et sensibilité aux maladies*	
Rendement	très élevé
Précocité	moyenne à tardive
PMG	élevé
Hauteur des plantes	moyenne à haute
Sensibilité à la verse	faible à moyenne
Oïdium	faible
Rouille brune	faible
Rouille jaune	faible à moyenne
Septoriose foliaire	faible
Résistance à l'hiver	moyenne à élevée

*Classement obtenteur

La description et la caractérisation variétales présentées sont fondées sur des résultats expérimentaux et sur l'expérience acquise en culture pratique, sans garantie. La réussite de la culture dépend de facteurs indépendants de notre volonté et sans rapport avec les caractéristiques variétales indiquées. En conséquence, nous ne pouvons garantir la réussite de la culture. Il appartient au seul acheteur de décider si cette variété convient à une culture dans ses conditions locales.

Conseils pour réussir la culture		
Choix de la parcelle	Rendements en engrain les plus élevés, avec une excellente qualité boulangère et un arôme intense, pour un minimum d'intrants.	
Rotation	Positionnement dans la rotation comme un blé vêtu ; maturité environ 1 à 2 semaines après le blé ; bons résultats après un maïs grain.	
Période de semis	De fin septembre à mi-octobre	
Semis	Période de semis	Densité de semis
	Début octobre	330 à 380 épillets germinables/m² (env. 140 à 160 kg/ha)
	Fin octobre	380 à 430 épillets germinables/m² (env. 160 à 180 kg/ha)
	Début mars	350 à 400 épillets germinables/m² (env. 150 à 170 kg/ha)
	Fin mars	420 à 460 épillets germinables/m² (env. 180 à 200 kg/ha)
	Les semis de printemps ne sont recommandés qu'en cas de disponibilité en eau optimale. Une augmentation de la densité de semis liée aux pratiques de l'agriculture biologique (par ex. passage de la herse étrille) peut être décidée à l'appréciation de chacun.	
Gestion des adventices	Un passage de herse étrille à l'aveugle à l'automne est conseillé afin de maîtriser la pression des adventices, en raison du démarrage lent de la culture. Un nouveau passage à la herse est possible à partir du stade 3 feuilles.	

Südwestdeutsche Saatzucht GmbH & Co. KG
Im Rheinfeld 1-13 / D-76437 Rastatt
Tél. : 0 72 22/77 07-0 / Fax : 0 72 22/77 07-77
getreide@suedwestsaat.de

Distribution : Südwestsaat GmbH
Im Rheinfeld 1-13 / D-76437 Rastatt
Tél. : 0 72 22/77 07-0 / Fax : 0 72 22/77 07-77
getreide@suedwestsaat.de