




RAMIRO

RAY-GRASS ITALIEN
ALTERNATIF

DIPLOÏDE



Semental
INNOVATION & PERFORMANCE



ESPÈCE
PRÉCOCITÉ
PLOÏDIE

RAY-GRASS ITALIEN
ALTERNATIVE
DIPLOÏDE



» MORPHOTYPE :

- | | |
|--------------------------|------------|
| • Port : | Dressé |
| • Finesse du feuillage : | Assez fin |
| • Couleur du feuillage : | Vert-clair |

» PRÉCOCITÉ :

- | | |
|----------------------------------|----------|
| • Date de départ en végétation : | 10 Mars |
| • Date de début d'épiaison : | 15 Avril |

» PRODUCTIVITÉ († M.S./ha) :

- | | |
|--------------------------------|------|
| • Production été / automne : | 4,5 |
| • Production de printemps : | 6,8 |
| • Production totale 2 coupes : | 11,3 |

» CARACTÉRISTIQUES QUALITATIVES :

- | | |
|---------------------------|-----|
| • Alternativité : | 6,1 |
| • Remontaison : | 6,8 |
| • Résistance aux maladies | |
| - Rouille : | 6,4 |
| - Helminthosporiose : | 5,9 |
| • Résistance à la verse : | 4,6 |

Notations de 1 à 9. 9 : le caractère s'exprime fortement

» AIRE DE CULTURE :

Toute France

» DESTINATION :

Enrubannage arriéré-saison
Déprimage sortie Hiver
Ensilage

» PRÉCONISATIONS SEMIS (kilos / ha) :

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| • En pur : | 25 kg |
| • En association : | 10/15 kg Trèfles annuels d'hiver |