

CEGALO

Des protéines en dérobée

CEGALO

DES PROTEINES EN DEROBEE



CARACTERISTIQUES :

- Trèfle incarnat
- Très précoce

- **Pérennité :** 6 à 9 mois
- **Type de sol :** tous
- **Exploitation :** ensilage, enrubannage, pâturage possible

CEGALO est une variété de trèfle incarnat appréciée pour sa production très précoce et abondante dès le début printemps.

● VIGUEUR D'INSTALLATION ET COUVERTURE DU SOL :

CEGALO s'implante très rapidement dès l'automne. Son excellente couverture de sol limite fortement le salissement et lui permet de s'adapter à de nombreuses conditions pédo-climatiques.

● PRODUCTION ABONDANTE ET TRES PRECOCE :

CEGALO se distingue nettement par sa précocité et son rendement très élevé lors de son exploitation au printemps. Sa vigueur de pousse en sortie d'hiver lui permet de bien s'exprimer en association avec des ray-grass et de libérer le sol tôt, sans pénaliser la culture suivante.

● EXPLOITATION :

En pâture :

- Seul ou associé à une graminée, il peut être exploité en pâture dès la fin de l'hiver puis plusieurs fois au printemps, tant que le bourgeon terminal n'est pas coupé, sinon sa pousse est stoppée.

En fauche :

- Il est difficile de l'exploiter seul en fauche.

CEGALO est plutôt à privilégier en association avec des ray-grass d'Italie afin d'assurer une production de printemps riche en énergie et protéines. Il produit uniquement sur la 1ère coupe.

CEGALO permettra de diminuer les coûts de production (moins d'engrais azotés et moins de concentrés).

Lors de la réalisation de vos ensilages et enrubannages, il est impératif d'utiliser **Silo-King® Herbe**. Cet additif biologique vous permettra de diminuer les pertes, d'améliorer la qualité alimentaire et la qualité sanitaire de vos fourrages.

CONSEILS D'IMPLANTATION :

- Semis :

- de août à septembre
- préparation du sol fin en surface et rouler juste après le semis
- profondeur de semis optimale : 1 à 2 cm maxi
- dose de semis : en pur : 20 à 25 kg /ha
en association : 10 à 15 kg avec 10 à 15 kg de ray-grass d'Italie


- Protection :

- surveiller les limaces à l'implantation et intervenir si nécessaire

- Fertilisation :


- Avant tout apport de fertilisant, tenir compte des éléments disponibles dans les sols (en se référant à l'analyse de sol) et des restitutions apportées par les animaux.

Production abondante (en T.M.S./ha)



Semis le 03 septembre 2010 - Récolte le 19 avril 2011
Essais développement JD - Station de St Sauvant (86)

Précocité de floraison (date floraison)



Essais développement JD - Station de St Sauvant (86)



Sélection trèfle incarnat
Station de sélection JD de St Sauvant (86)

Les renseignements contenus dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions pédo-climatiques et des conditions culturales