

MÉLANGE FOURRAGER ANNUEL

M
LES MÉLANGES

M-Tropic

***Du fourrage de qualité
au cœur de l'été***

JOUFFRAY-DRILAUD

JD
by
JOUFFRAY-DRILAUD

M-Tropic

Du fourrage de qualité au coeur de l'été



COMPOSITION :

- 40 % Millet perlé fourrager SUNFEED
- 60 % Trèfle d'Alexandrie fourrager

CARACTÉRISTIQUES :

- **Pérennité :** 3 à 6 mois
- **Type de sol :** tous
- **Exploitation :** fauche, pâture

M-Tropic est une composition de graminées et légumineuses annuelles estivales prête à l'emploi, destinée à produire du fourrage en été que ce soit en culture principale ou comme dérobée.

UNE PRODUCTION ESTIVALE IMPORTANTE :

M-Tropic est composé d'espèces fourragères qui s'implantent rapidement et procurent une production fourragère totale très importante (10 à 15 t. M.S./ha) en plusieurs exploitations. Une fois implanté, **M-Tropic** est plus résistant au sec et à la chaleur que le sorgho fourrager, ce qui lui permet de garder un feuillage vert et frais.

UNE EXCELLENTE VALEUR ALIMENTAIRE :

Récolté au stade feuillu (avant le stade 60 cm), M-Tropic fournit un fourrage de très bonne qualité notamment en protéines (à noter que le millet perlé est 2 fois plus riche en lysine et méthionine que le sorgho fourrager).

UNE GRANDE POLYVALENCE D'EXPLOITATION :

M-Tropic est adapté à la fauche et à la pâture :

En fauche : Il offre une grande souplesse d'utilisation (enrubannage, ensilage, affouragement en vert, foin ...).

En pâture : Cette composition est très appréciée au pâturage par l'ensemble des animaux.

Faire pâturer **M-Tropic** au stade feuillu (entre 30 et 60 cm) pour bénéficier de toute la qualité alimentaire et favoriser le tallage, puis faire consommer les repousses toutes les 3 semaines.

- A noter que le millet perlé fourrager ne contient pas d'acide cyanhydrique (= pâturage précoce possible) et que le trèfle d'Alexandrie n'est pas météorisant.
- **M-Tropic** est sensible au froid, à réserver aux zones plutôt chaudes (cf. carte) et se détruit dès la première gelée.


Ensilage, enrubannage, foin... pour améliorer l'efficacité alimentaire et la qualité sanitaire de vos fourrages récoltés, nous vous conseillons l'utilisation de **SILO-KING®**. Cet additif microbiologique vous permettra de valoriser tous vos fourrages.

CONSEILS D'IMPLANTATION :

- **Semis :**
 - . de mi-mai à mi-juillet (suivant les zones de culture)
 - . semer dans un sol suffisamment réchauffé (T.>16 à 18 °C)
 - . profondeur de semis optimale : 1 à 2 cm
 - . préparation du sol fin en surface, rouler sitôt le semis
 - . dose de semis en bonnes conditions : 22,5 à 25 kg/ha
- **Protection :**
 - . surveiller les limaces à l'implantation et intervenir si nécessaire
- **Fertilisation :**
 - . Dès l'implantation et après chaque exploitation.

Les renseignements contenus dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions pédo-climatiques et des conditions culturales

Production en 80 jours (t. M.S./ha)



Essai développement JD - Station de St Sauvant (86)

Valeur alimentaire

	M-Tropic	Millet perlé seul	Sorgho fourrager (Sudan)
Rdt t. M.S./ha	3,95	3,83	3,74
UFL (/kg) :	0,91	0,89	0,90
MAT (%) :	18,8 %	17,5 %	11,4 %
PDIN (g/kg) :	110	102	66
PDIE (g/kg) :	83	80	70

M-Tropic au stade feuillu (60 cm)
Essai développement JD - Station de St Sauvant (86)

Zones de culture de M-Tropic

