

Fiche Variétale

ORYX

Ray-grass d'Italie (2n)

Lolium multiflorum Lam.

Bon à savoir

ORYX ramène aux écotypes provenant des zones marginales pour le raygrass d'Italie en Suisse orientale. Elle se caractérise par une bonne résistance à la pourriture des neiges et par un début de croissance précoce au printemps. ORYX fournit des rendements élevés et sûrs en fourrage sain, facile à conserver. Après une coupe, les gazons se referment rapidement et ne laissent pratiquement pas place aux adventices. ORYX convient particulièrement bien pour une utilisation allant jusqu'à la première coupe après le deuxième hivernage, avant de cultiver du maïs.

Descendance

Matériel de départ

Sélection récurrente de matériel provenant des écotypes suisses d'une collecte de 1987.

Semence M0

Semis en lignes en 1993 (LI9315) et récolte de 81 familles.

Bibliographie

Suter D.,Hirschi H.-U.,Chapuis St., 2010. 29 Neuzüchtungen von Italienischem Raigras geprüft. Agrarforschung Schweiz 1(7), 280-285

Boller B., Schubiger F.-X., Tanner P., 2008. Neue Italienische Raigräser: Caribu und Tigris. Agrarforschung 15(8), 402-407

Essais variétaux

Situation en Suisse

Inscrite dans la liste des variétés recommandées depuis 2000

Situation à l'étranger

DE (Représentat: Freudenberger, Krefeld)

LU

Caractères agronomiques

Résultats des essais variétaux officiels 2007-2009

(Suter et al. 2010)

(Outer et al, 2010)	ORYX	Moyenne
Rendement	4.0	4.5
Aspect général	3.4	3.6
Vitesse de levée du semis	2.8	2.9
Force de concurrence	4.7	4.7
Persistance	4.2	4.4
Résistance aux conditions hivernales	4.0	4.5
Résistance aux maladies foliaires	3.4	3.5
Résistance au flétrissement bactérien	2.0	2.0
Digestibilité (DMO)	5.0	5.3
Indice (moyenne pondérée des notes)	3.7	3.9

Echelle de notation 1 = très bon, 5 = moyen, 9 = très mauvais Rendement Moyenne de 4 lieux d'essais pendant 2 ans

Moyenne des variétés témoin

Description selon les principes directeurs de l'UPOV

Examen DHS à La Minière, GEVES (FR), 1997-2000

	` ,.		
N°UPOV	Caractères	Niveaux d'expression	Note
1	Ploïdie	diploïde	2
3	Tendance à former des inflorescences (sans vernalisation)	faible	3
5	Feuille: couleur, l'année du semis	vert moyen	5
8	Epoque d'épiaison (après vernalisation)	précoce à moyenne	4
10	Dernière feuille: longueur	moyenne	5
11	Dernière feuille: largeur	moyenne	5
12	Tige: longueur de la tige la plus longue, y compris l'inflorescence	moyenne	5

Version: 06.06.2012

Éditeur: Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART,

Reckenholzstrasse 191, 8046 Zürich

En collaboration avec: Delley Semences et Plantes SA (DSP), 1567 Delley

Rédaction: Beat Boller, Peter Tanner, Lucienne Adam, ART

Copyright: © 2012, Reproduction autorisée avec citation de la source.





Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon ART